

Led	Sortskode	Sortsnavn	Udbytte			Dyrkningsegenskaber			Kvalitetsegenskaber				
			hkg/ha	korrigeret til 86% tørstof		Plante højde v. høst, cm	Lejesæd v. blomstring, skala: 0-10	Lejesæd v. høst, skala: 0-10	Frøvægt, mg pr. frø	Rumvægt, g pr. liter	Proteinindhold, pct	Protein, kg/ha	Protein, kg/ha, fnt
			Varde	Gns.	FHT	1	1	1	1	1	1	1	1
		<i>Antal fs.</i>		1	1								
1	32956	GL Arabella	54.2	54.2	100	70	0.0	0.0	580	818	28.5	1328	100
2	33762	Augusta	55.8	55.8	103	60	0.0	0.0	647	814	28.7	1377	104
3	33773	Tundra	58.3	58.3	108	65	0.0	0.0	661	772	29.5	1479	111
4	35878	PHP WB 21-1	64.8	64.8	120	65	0.0	0.0	723	781	29.2	1627	123
5	35922	Pantani	61.3	61.3	113	70	0.0	0.0	693	798	27.6	1455	110
6	36675	Curlew	57.3	57.3	106	65	0.0	0.0	711	787	28.1	1385	104
7	36676	RLW 217904	66.9	66.9	123	70	0.0	0.0	826	756	30.3	1743	131
		LSD 0.05	7.8	7.8	14								
		GNS UDBYTTE	59.8										

**Udbytte i hkg/ha korrigeret til 86 % tørstof**

<b>Varde</b>	<b>Gns.</b>	<b>Rækkefølge</b>
123 RLW 217904	123 RLW 217904	1
120 PHP WB 21-1	120 PHP WB 21-1	2
113 Pantani	113 Pantani	3
108 Tundra	108 Tundra	4
106 Curlew	106 Curlew	5
103 Augusta	103 Augusta	6
54.2 GL Arabella	54.2 GL Arabella	7
14 LSD 0.05	14 LSD 0.05	

## Translations

Afgrødehøjde	<i>Crop height</i>	Standardkvalitet	<i>Standard quality</i>
Blomstring	<i>Flowering</i>	Stivelsesindhold	<i>Starch content</i>
Blødgøring	<i>Softening</i>	Strå længde, cm	<i>Straw length</i>
Brunrust	<i>Brown rust (Puccinia recondita)</i>	Udbytte	<i>Yield</i>
Brødhøjde	<i>Bread height</i>	Vandoptagelse	<i>Water absorption</i>
Brødvolumen	<i>Bread volume</i>		
Bygrust	<i>Barley Rust (Puccinia hordei)</i>		
Dyrkningsegenskaber	<i>Agronomic traits</i>		
EFOSi	<i>Enzyme digestible organic matter at ileum</i>		
EFOSsvin	<i>Enzyme digestible organic matter in pigs</i>		
Erucasyre	<i>Erucic acid</i>		
FEso pr. hkg	<i>Feed units, adult pigs</i>		
FEsv pr. hkg	<i>Feed units, growing pigs</i>		
fht	<i>Index</i>		
Faldtal	<i>Falling number</i>		
Foderkvalitet	<i>Feed quality</i>		
Frøkvalitet	<i>Seed quality</i>		
Frøvægt	<i>Seed weight</i>		
Glucosinolatindhold	<i>Glucosinolate content</i>		
Gluten i kerner (14% vand)	<i>Gluten content in grains at 14 % water</i>		
Gns.	<i>Average</i>		
Gråplet/brunplet	<i>Septoria tritici/Stagonospora nodorum</i>		
Gulrust	<i>Yellow rust (Puccinia striiformis)</i>		
hkg/ha korrigeret til 85 % tørstof	<i>hkg/ha adjusted to 85% dry matter</i>		
Hvedebladplet	<i>Tan spot, DTR (Pyrenophora tritici-repentis)</i>		
Karakter	<i>Score</i>		
Kerne kvalitet	<i>Grain quality</i>		
Klæbrighed	<i>Stickyness</i>		
Kornvægt, mg pr. korn	<i>Thousand kernel weight (mg/kg)</i>		
Kvalitetsegenskaber	<i>Quality traits</i>		
Led	<i>Entry</i>		
Lejesæd	<i>Lodging</i>		
Linolénsyre	<i>Linolenic acid</i>		
Linolsyre	<i>Linoleic acid</i>		
Meldug	<i>Mildew (Erysiphe graminis)</i>		
Meludbytte	<i>Flour yield</i>		
Modning, dato	<i>Ripening date</i>		
Nedknækning, aks	<i>Necking</i>		
Nedknækning, strå	<i>Brackling</i>		
Observations-parceller	<i>Observation-plots</i>		
Olieindhold	<i>Oil content</i>		
Oliesyre	<i>Oleic acid</i>		
Plantehøjde	<i>Plant height</i>		
Proteinindhold, pct.	<i>Protein content</i>		
Ramularia	<i>Ramularia (Ramularia collo-cygni)</i>		
Rumvægt, g pr. liter	<i>Specific weight</i>		
Sedimentation	<i>Zeleny sedimentation value</i>		
Skala	<i>Scale</i>		
Skoldplet	<i>Leaf Blotch (Rhynchosporium secalis)</i>		
Sort	<i>Variety</i>		
Sort., pct. kerner > 2,5 mm	<i>Grading, pct. kernels &gt; 2.5 mm</i>		
Sort., pct. kerner > 2,8 mm	<i>Grading, pct. kernels &gt; 2.8 mm</i>		
Sortskode	<i>Variety code</i>		
Stabilitet	<i>Stability</i>		