

| Led | Sortskode | Sortsnavn | Udbytte | | | | Dyrkningsegenskaber | | | | | Kvalitetsegenskaber | | | | |
|-----|-----------|-------------|-----------------------------------|-----------|------|-----|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | hkg/ha korrigeret til 86% tørstof | | | | Frøkvalitet | | | | | | | | | |
| | | | Dyngby | Holstebro | Gns. | FHT | Beg. blomstring, dato | Modning, dato | Plante højde v. høst, cm | Lejesæd v. blomstring, skala: 0-10 | Lejesæd v. høst, skala: 0-10 | Frøvægt, mg pr. frø | Rumvægt, g pr. liter | Proteinindhold, pct | Protein, kg/ha | Protein, kg/ha, fnt |
| | | Antal fs. | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 28162 | Primadonna | 35.3 | 36.3 | 35.8 | 100 | 1706 | 1708 | 66 | 0.0 | 0.0 | 161 | 755 | 30.2 | 930 | 100 |
| 2 | 24795 | Iris | 28.9 | 43.2 | 36.1 | 101 | 1706 | 2708 | 60 | 0.0 | 0.0 | 145 | 778 | 31.6 | 982 | 106 |
| 3 | 35321 | Carabor | 39.4 | 41.0 | 40.2 | 112 | 1606 | 2608 | 60 | 0.0 | 0.0 | 162 | 769 | 31.4 | 1085 | 117 |
| 4 | 35490 | Bolero | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 108 | 1606 | 2708 | 58 | 0.0 | 0.0 | 173 | 769 | 31.8 | 1058 | 114 |
| 5 | 35953 | Agat | 31.6 | 38.9 | 35.3 | 99 | 1806 | 3008 | 59 | 0.0 | 0.0 | 155 | 770 | 33.4 | 1017 | 109 |
| 6 | 36025 | NOS 18-09 | 37.8 | 40.6 | 39.2 | 109 | 1806 | 1708 | 74 | 0.0 | 0.0 | 137 | 777 | 30.1 | 1012 | 109 |
| 7 | 36097 | Lunabor | 41.3 | 41.6 | 41.5 | 116 | 1606 | 2708 | 61 | 0.0 | 0.0 | 142 | 776 | 30.0 | 1068 | 115 |
| 8 | 36100 | SM Orion | 31.5 | 40.7 | 36.1 | 101 | 1606 | 2708 | 60 | 0.0 | 0.0 | 152 | 777 | 35.7 | 1109 | 119 |
| 9 | 36243 | Bazalt | 23.7 | 36.0 | 29.9 | 84 | 2006 | 2908 | 66 | 0.0 | 0.0 | 134 | 772 | 32.8 | 845 | 91 |
| | | LSD 0.05 | 5.1 | 3.9 | 3.0 | 8 | | | | | | | | | | |
| | | GNS UDBYTTE | 34.3 | 39.7 | | | | | | | | | | | | |

Udbytte i hkg/ha korrigeret til 86 % tørstof

| Dyngby | Holstebro | Gns. | Rækkefølge |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 117 Lunabor | 119 Iris | 116 Lunabor | 1 |
| 112 Carabor | 115 Lunabor | 112 Carabor | 2 |
| 110 Bolero | 113 Carabor | 109 NOS 18-09 | 3 |
| 107 NOS 18-09 | 112 SM Orion | 108 Bolero | 4 |
| 35.3 Primadonna | 112 NOS 18-09 | 101 SM Orion | 5 |
| 90 Agat | 107 Agat | 101 Iris | 6 |
| 89 SM Orion | 107 Bolero | 35.8 Primadonna | 7 |
| 82 Iris | 36.3 Primadonna | 99 Agat | 8 |
| 67 Bazalt | 99 Bazalt | 84 Bazalt | 9 |
| 14 LSD 0.05 | 11 LSD 0.05 | 8 LSD 0.05 | |

Translations

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Afgrødehøjde | <i>Crop height</i> | Standardkvalitet | <i>Standard quality</i> |
| Blomstring | <i>Flowering</i> | Stivelsesindhold | <i>Starch content</i> |
| Blødgøring | <i>Softening</i> | Strå længde, cm | <i>Straw length</i> |
| Brunrust | <i>Brown rust (Puccinia recondita)</i> | Udbytte | <i>Yield</i> |
| Brødhøjde | <i>Bread height</i> | Vandoptagelse | <i>Water absorption</i> |
| Brødvolumen | <i>Bread volume</i> | | |
| Bygrust | <i>Barley Rust (Puccinia hordei)</i> | | |
| Dyrkningsegenskaber | <i>Agronomic traits</i> | | |
| EFOSi | <i>Enzyme digestible organic matter at ileum</i> | | |
| EFOSsvin | <i>Enzyme digestible organic matter in pigs</i> | | |
| Erucasyre | <i>Erucic acid</i> | | |
| FEso pr. hkg | <i>Feed units, adult pigs</i> | | |
| FEsv pr. hkg | <i>Feed units, growing pigs</i> | | |
| fht | <i>Index</i> | | |
| Faldtal | <i>Falling number</i> | | |
| Foderkvalitet | <i>Feed quality</i> | | |
| Frøkvalitet | <i>Seed quality</i> | | |
| Frøvægt | <i>Seed weight</i> | | |
| Glucosinolatindhold | <i>Glucosinolate content</i> | | |
| Gluten i kerner (14% vand) | <i>Gluten content in grains at 14 % water</i> | | |
| Gns. | <i>Average</i> | | |
| Gråplet/brunplet | <i>Septoria tritici/Stagonospora nodorum</i> | | |
| Gulrust | <i>Yellow rust (Puccinia striiformis)</i> | | |
| hkg/ha korrigeret til 85 % tørstof | <i>hkg/ha adjusted to 85% dry matter</i> | | |
| Hvedebladplet | <i>Tan spot, DTR (Pyrenophora tritici-repentis)</i> | | |
| Karakter | <i>Score</i> | | |
| Kernekvalitet | <i>Grain quality</i> | | |
| Klæbrighed | <i>Stickyness</i> | | |
| Kornvægt, mg pr. korn | <i>Thousand kernel weight (mg/kg)</i> | | |
| Kvalitetsegenskaber | <i>Quality traits</i> | | |
| Led | <i>Entry</i> | | |
| Lejesæd | <i>Lodging</i> | | |
| Linolénsyre | <i>Linolenic acid</i> | | |
| Linolsyre | <i>Linoleic acid</i> | | |
| Meldug | <i>Mildew (Erysiphe graminis)</i> | | |
| Meludbytte | <i>Flour yield</i> | | |
| Modning, dato | <i>Ripeningdate</i> | | |
| Nedknækning, aks | <i>Necking</i> | | |
| Nedknækning, strå | <i>Brackling</i> | | |
| Observations-parceller | <i>Observation-plots</i> | | |
| Olieindhold | <i>Oil content</i> | | |
| Oliesyre | <i>Oleic acid</i> | | |
| Plantehøjde | <i>Plant height</i> | | |
| Proteinindhold, pct. | <i>Protein content</i> | | |
| Ramularia | <i>Ramularia (Ramularia collo-cygni)</i> | | |
| Rumvægt, g pr. liter | <i>Specific weight</i> | | |
| Sedimentation | <i>Zeleny sedimentation value</i> | | |
| Skala | <i>Scale</i> | | |
| Skoldplet | <i>Leaf Blotch (Rhynchosporium secalis)</i> | | |
| Sort | <i>Variety</i> | | |
| Sort., pct. kerner > 2,5 mm | <i>Grading, pct. kernels > 2.5 mm</i> | | |
| Sort., pct. kerner > 2,8 mm | <i>Grading, pct. kernels > 2.8 mm</i> | | |
| Sortskode | <i>Variety code</i> | | |
| Stabilitet | <i>Stability</i> | | |